

LACTUCA

	Fleurs bleues. Capitules de 3 cm de diam. Feuilles pennatiséquées coupées en segments foliaires gén. étroits. Plantes des pelouses sèches et rochers calcaires, vivaces, de 10-40 cm de haut, glabres.	2
1	Fleurs jaunes. Capitules de moins de 1,5 cm de diam, Feuilles dentées à pennatiséquées (alors segments foliaires larges). Plantes des sites rudéralisés ou autres milieux possibles, annuelles, de gén. plus de 40 cm de haut, pubescentes au min. dans le bas de la tige.	3
2	Feuilles pennatifides à pennatiséquées. Plantes vivaces, de 10-40 cm de haut, gén. glabres. Akènes prolongés en un bec grêle. Plantes des pelouses sèches et rochers calcaires. <i>10-40 cm. — Mai-juin. — Rochers, pelouses sèches, surtout sur calcaire ou sur craie. — Pic. (surtout mér.), Mosan (vallées), Lorr., Champ. : AR ; Tert. par. : R ; Brab. (sur craie), Ard. or. (Oesling) : RR.</i>	<i>L. perennis</i> (Laitue vivace)
	Feuilles inf. lyrées, avec une seule paire de segments latéraux, parfois réduits. Feuilles caulinaires lobées et dentées. Akènes sans bec. Plantes vivaces, pouvant atteindre 2-3 m de hauteur, glabres ou à poils raides épars, des talus, lisières ou haies. <i>Juill.-août. — Talus, lisières forestières, haies, terrains vagues. Deux sous-espèces dans le territoire de la Flore.</i>	<i>L. macrophylla</i> (Laitue à grandes feuilles)
3	Face inf. des feuilles caulinaires non épineuse sur la nervure centrale. Feuilles irrégulièrement dentées. Capitules long. pédonculés, à gén. 5 fleurs ligulées. <i>40-90 cm. — Juin-août. — Bois frais, sur des sols riches, coupes et lisières forestières, rochers calcaires ombragés, vieux murs, chemins ombragés. — Mosan, Lorr., Eifel centr. : AC ; Brab., Ard., Tert. par. : AR ; ailleurs : R-RR.</i>	<i>L. muralis</i> (Laitue des murailles)
	Face inf. des feuilles caulinaires épineuse sur la nervure centrale. Feuilles régulièrement dentées. Capitules sessiles ou courtement pédonculés, à plus de 5 fleurs ligulées.	4
4	Tige gén. pourpre foncé. Feuilles caulinaires gén. étalées horizontalement. Plantes à odeur désagréable de pavot. Akènes de 4-5 mm de long., noirâtres. <i>50-200 cm. — Juill.-août. — Coupes et lisières forestières, friches, éboulis de carrières, bord des chemins, terrains vagues, ballast des voies ferrées, vieux murs ; espèce plutôt thermophile. — Champ. : AC ; Tert. par. : AR ; Lorr. : R ; Mosan : R-RR ; Pic., Ard. or. (Oesling), Eifel centr. : RR ; ailleurs : parfois introduit.</i>	<i>L. virosa</i> (Laitue vireuse)
	Tige gén. vert pourpre. Feuilles caulinaires gén. dressées verticalement. Plantes à odeur non désagréable. Akènes de 3-4 mm de long., gris brun. <i>50-120 cm. — Juill.-oct. — Terrains vagues, friches, bord des chemins, berge des cours d'eau. — Mar. (sauf S), Pic. or., Mosan, Lorr., Champ., Tert. par. : C-AC ; Brab. : AC ; Fl., Camp. : R ; ailleurs : RR ou nul.</i>	<i>L. serriola</i> (Laitue scariola)