



CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE® asbl



# Initiation à l'identification des oiseaux

par Francis MAUHIN



# Initiation à l'identification des oiseaux

par Francis MAUHIN

D'après Valéry SCHOLLAERT, « Méthode formation ornitho ».  
Éditions Weyrich, 2008.



# INITIATION À L'IDENTIFICATION DES OISEAUX

Francis MAUHIN<sup>1</sup>

## 1. G R O U P E S D E F A M I L L E S<sup>2</sup>

### 1.1. Les Gallinacés (« Poules »)

Oiseaux rondelets, parfois gros, qui courent au sol, ou volent très rapidement de manière rigide avec de courtes ailes. Attention aux oiseaux introduits par l'homme.

Phasianidae	Perdrix, tétaras, lagopèdes, cailles, gèlinottes, faisans.	Confusion possible avec les Rallidae.
Pteroclididae	Gangas.	Sud de la France (plaine de La Crau).

### 1.2. Les grands échassiers (« Cigognes »)

Oiseaux grands ou très grands, avec des pattes longues, bec long, qui marchent au sol, sur les berges ou dans l'eau. Attention à la confusion possible avec des limicoles.

Ciconiidae	Cigognes.	Taille énorme, plumage noir et blanc, très longues pattes et long bec. En vol, silhouette très rigide, cou tendu, vol à voile, peu de battement d'ailes.
Ardeidae	Hérons, aigrettes et alliés.	= Cigognes, mais taille plus réduite, bec plus court, cou plus long, corps moins massif. En vol, cou replié en « S ».
Gruidae	Grues.	Très sociables et bruyantes. = Cigognes, mais plumage moins contrasté, bec nettement plus court. Utilisent gén. le vol battu, rarement le vol à voile. = Ardeidae, mais aspect massif de l'arrière de l'oiseau (longues rémiges tertiaires), bec plus court, cou tendu.
Threskiornithidae	Ibis, spatules.	Corps épais, bec très long souvent recourbé vers le bas, parfois élargi au bout en forme de cuillère. En vol, ailes peu digitées, bien plus courtes et étroites que chez les autres échassiers. De plus, ils battent rapidement des ailes (comme les cormorans). = Aigrettes, mais aspect plus massif (corps, cou et pattes).
Otididae	Outardes.	Oiseaux terrestres de grande taille, corps massif, pattes puissantes. Cou long et assez épais. Vol lourd, puissant et soutenu, glissant à l'approche de l'atterrissage.
Phoenicopteridae	Flamants.	Oiseaux bien connus.

<sup>1</sup> Président de la section des Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB), *ATTIRE D'AILLES*.

<sup>2</sup> Regroupement par ressemblance superficielle (phénotype).

### 1.3. Les pélagiques (« Albatros »)

Oiseaux qui utilisent les vents et vagues pour se déplacer rapidement en mer. Ne se posent quasiment jamais ailleurs que sur la mer.

Procellariidae	Puffins, pétrels.	Excellents voiliers qui « surfent » au-dessus des vagues en effectuant de grandes courbes. = Laridae, mais ailes plus étroites et rigides, corps plus svelte.
Hydrobatidae	Océanites.	Papillonnent au ras de l'eau. Rappellent plutôt des hirondelles ou des guifettes que des oiseaux marins.
Sulidae	Fous.	Grande taille, corps fin et fuselé, queue pointue, bec long et fort en forme de poignard. Ailes très longues, étroites et pointues.
Stercorariidae	Labbes.	Oiseaux parasites qui se nourrissent en volant les proies des autres oiseaux. = Laridae, mais ailes plus pointues (faucons).
Alcidae	Pingouins et alliés.	Ailes étroites et courtes qui volent à vive allure, sur une trajectoire directe. En vol et posé, rappellent plutôt les nageurs (grèbes, Anatidae).
Fregatidae	Frégates.	Immenses oiseaux marins parasites, gén. noirs. Vol puissant, souple, longue queue fourchue

### 1.4. Les nageurs (« Canards »)

Oiseaux qui nagent, barbotent dans l'eau ou plongent en s'immergeant totalement. Risque de confusion avec certains Rallidae (foulques, gallinules) ou avec des oiseaux pélagiques posés sur l'eau.

Anatidae	Canards, fuligules, harles, cygnes, oies...	Corps massif, queue courte, bec large et cou relativement épais. Confusion possible entre les piscivores et les grèbes (Podicipedidae).
Podicipedidae	Grèbes.	Cou étroit, tête huppée ou ébouriffée, long bec étroit et pointu, et absence de queue. En vol, battement d'ailes très rapide. = Anatidae, mais ailes très étroites et pointues, cou très long. = Plongeurs, mais ceux-ci ont un vol plus lent et plus lourd.
Gaviidae	Plongeurs.	Bien plus grands et massifs que les grèbes, mais bec assez semblable bien que plus fort. Tête lisse, arrondie ou avec une « bosse », pas de tête huppée ou ébouriffée. = Cormorans, mais ceux-ci ont une tête ébouriffée, un bec crochu, un plumage toujours foncé, une silhouette plus lourde, moins élégante.
Phalacrocoracidae	Cormorans.	Corps, cou et queue allongés ; bec fort, comprimé latéralement et crochu ; pattes courtes et fortes. Au repos, cou replié en « S », mais tendu en vol (attitude d'oie, mais alors queue plus longue). Ailes longues, assez larges à l'aisselle et pointues. Vol énergique, soutenu, rigide, souvent en formation.

### 1.5. Les rapaces diurnes (« Aigles »)

Oiseaux normalement identifiés au premier coup d'œil.

Accipitridae	La plupart des rapaces diurnes.	Oiseaux normalement identifiés au premier coup d'œil.
Falconidae	Faucons.	Oiseaux vifs, aile primaire pointue et effilée, bien plus longue que l'aile secondaire. Queue étroite aux bords souvent parallèles, et sa longueur $\geq$ à la largeur de l'aile. Œil noir, front assez haut.
Pandionidae	Balbuzard pêcheur.	Silhouette en « M » étiré avec ailes très longues, étroites. Queue courte ( $\frac{1}{2}$ largeur de l'aile à la base). Plumage toujours noir ou brun foncé et blanc.

### 1.6. Les Rallidés (« Poules d'eau »)

Certains rappellent largement les nageurs (foulques...), d'autres des limicoles (marouettes, râles...). Toutefois, bec bien plus épais, pattes plus épaisses, longs doigts.

Rallidae	Foulques, gallinules, marouettes, râles.	= Nageurs, mais habiles au sol (et même dans les arbres). Flottent très haut. = Limicoles, mais pattes moins longues, plus épaisses et munies de plus longs doigts. Bec plus épais et souvent plus court. Jamais sur les vasières ouvertes.
----------	--	--

### 1.7. Les Limicoles (« Chevaliers »)

Petits échassiers qui généralement courent sur le bord de l'eau.

Haematopodidae	Huîtriers.	Gros limicoles noirs et blancs avec un long bec rouge et pattes épaisses, gén. rouges ou rougeâtres.
Recurvirostridae	Échasses et avocettes.	Grands, élégants, noirs et blancs, aux pattes très longues et fines, bec très fin et parfois retroussé vers le haut.
Burhinidae	Œdicnèmes.	Grands, bec court, très gros œil jaune, longues pattes jaunes. Vivent en milieu sec.
Charadriidae	Gravelots, vanneaux & pluviers.	= Scolopacidae, mais bec court, mesurant environ la moitié de la longueur de la tête et un œil noir. Pattes moyennes à longues. Mouvements saccadés.
Scolopacidae	Bécasses, bécassines, courlis, chevaliers, tournepierres, bécasseaux, combattants, phalaropes.	Bec fin et plus long que Charadriidae (aussi long que la tête, jusqu'à trois fois plus long). Exception : les tournepierres (bec épais et court). Pas de mouvement saccadé, mais sont tout le temps en mouvement (semblent nerveux).
Glareolidae	Glaréoles.	Dans le sud de la France. Rappellent les sternes (ailes très longues et queue échancrée ou fourchue).

### 1.8. Les Laridés (« Mouettes »)

Oiseaux normalement identifiés au premier coup d'œil, mais risque de confusion avec les pélagiques.

Laridae	Mouettes, goélands.	Confusion possible avec les rapaces, notamment le Balbuzard pêcheur. Pattes longues, bec court, grosse tête. Excellents voiliers, assez massifs.
	Sternes, guifettes.	Plus sveltes que les mouettes et goélands, ailes plus étroites, plus coudées et pointues. Pattes courtes, front plat dans le prolongement du bec étroit, assez long et pointu. Vol gracieux et léger. Silhouette de plongeur, sauf guifettes qui ne plongent pas, donc tête plus arrondie et similitude avec les mouettes.

### 1.9. Les Columbidae (« Pigeons »)

Oiseaux bien connus normalement identifiés au premier coup d'œil.

Columbidae	Pigeons.	= Coucous et faucons, mais corps très élancé, la poitrine large, les ailes assez longues et surtout très étroites et effilées. Très longue queue étalée.
------------	----------	--

### 1.10. Les Cuculidae (« Coucous »)

Cuculidae	Coucous.	Posés, ces oiseaux peuvent être confondus avec des Columbidae et, en vol, avec des faucons ou des éperviers, mais queue très longue à la forme si particulière, ailes très étroites et pointues.
-----------	----------	--

### 1.11. Les nocturnes (« Hiboux »)

Oiseaux normalement identifiés au premier coup d'œil, mais qui de jour peuvent rappeler un rapace diurne.

Strigidae	La plupart des rapaces nocturnes.	= Busards, mais queue bien plus courte ( $\frac{1}{2}$ largeur de l'aile à la base), tête beaucoup plus massive.
Tytonidae	Effraie des clochers.	= Strigidae, mais plus pâle, notamment sur la face ; pas d'aspect moucheté.
Caprimulgidae	Engoulevents.	= Faucons, mais plus légers et souples. = Martinets, mais plus grands, plus lents et moins compacts. = Strigidae, mais ceux-ci plus massifs, tête très large, queue courte ; se tiennent souvent verticalement et non horizontalement.

### 1.12. Les aériens (« Hirondelles »)

Oiseaux normalement identifiés au premier coup d'œil, mais confusion possible avec les martinets.

Apodidae	Martinets.	Longues ailes fines en forme de faucille, battements rigides. Ne se perchent pas.
Hirundinidae	Hirondelles.	Ailes longues et pointues, larges à la base. Battements papillonnants, moins rigides. Se perchent.



### 1.13. Les cavicoles multicolores (« Martins-pêcheurs, pics, perroquets »)

Oiseaux normalement identifiés au premier coup d'œil.

Psittacidae	Perruches, perroquets.	Espèces férales faciles à identifier.
Upupidae	Huppe fasciée.	Petites ailes arrondies noires et blanches, couleur orangée, huppe énorme.
Alcedinidae	Martins-pêcheurs.	Bords des eaux poissonneuses, même salées. Bec en forme de harpon, queue courte, vol rapide.
Meropidae	Guêpiers.	Chasseurs d'insectes aériens. Vol d'hirondelle, ailes triangulaires, longue queue, plumage bariolé de vert et jaune.
Coraciidae	Rollier d'Europe.	Sud de la France. Taille d'un Choucas des tours, longues ailes, plumage bleu et roux unique en son genre.
Picidae	Pics.	Vivent sur les troncs d'arbre, mais se nourrissent parfois au sol. Pattes robustes, rectrices rigides, bec en forme de ciseau à bois. Attention toutefois au Torcol fourmilier qui peut être confondu avec un passereau, car il ne grimpe pas sur les troncs et son plumage n'est pas bariolé.

### 1.14. Les Corvidés (« Corbeaux »)

Oiseaux normalement identifiés au premier coup d'œil, mais confusion possible de loin pour les grandes espèces avec des rapaces diurnes.

Corvidae	Corbeaux et alliés.	Bec épais, assez droit, corps assez massif, ailes courtes à moyennement longues, mais toujours assez larges. Certains sont très colorés (les geais par exemple).
----------	---------------------	--

### 1.15. Les passereaux carnivores (« Pies-grièches »)

Passereaux prédateurs qui se nourrissent de (gros) vertébrés.

Laniidae	Pies-grièches.	Passereaux « rapaces ». Grosse tête arrondie, bec crochu, corps allongé, queue très longue. Vol onduleux et lourd rappelant des grives ou des Picidae.
----------	----------------	--

### 1.16. Les passereaux grimpeurs (« Grimpereaux »)

À l'instar des pics, ces passereaux grimpent sur les troncs et les branches, mais aussi sur les parois rocheuses. Les sittelles peuvent être confondues avec les « petites boules acrobatiques ».

Sittidae	Sittelles.	Bec long – aussi long que la tête – fort et pointu. Contraste entre les parties supérieures gris-bleu et les inférieures plus claires, chamois ou rousse. Queue courte, tête massive traversée par un masque noir. Très acrobatiques, même la tête en bas.
Certhiidae	Grimpereaux.	Fins (corps et tête), queue assez longue sur laquelle ils s'appuient. Plumage cryptique.
Tichodromidae	Tichodrome échelette.	En Suisse et localement en France, sur les falaises et les murailles. Plumage et bec typiques.

### 1.17. Les passereaux opportunistes (« Grives »)

La poitrine de ces oiseaux est plus massive que celle des insectivores et des granivores. La queue est plus large et leurs ailes sont plus longues et plus larges également. Bec gén. long, d'assez épais à étroit, et souvent légèrement arqué.

Turdidae	Merles, grives.	Oiseaux massifs à tête arrondie, bec long et fort, longue et large queue. Au sol, se déplacent en sautillant. Plumage assez uni (merles) ou tacheté dessous avec un pattern et des couleurs selon les espèces.
Sturnidae	Étourneau sansonnet.	Plumage noir ou noirâtre, queue très courte. En vol, ailes triangulaires bien visibles.
Alaudidae	Alouettes.	Couleur terre, presque toujours striées. Bec qui peut être court, queue gén. assez courte. Au sol, se déplacent en marchant.
Bombycillidae	Jaseur boréal.	Forme de la tête, contraste multicolore des ailes.
Oriolidae	Loriot d'Europe.	Jaune et noir.

### 1.18. Les petites boules acrobatiques (« Mésanges »)

Petits passereaux rondelets avec la tête proche du corps, d'où silhouette massive et ramassée. Petits becs assez fins – parfois légèrement coniques, mais alors toujours plus petit que celui des granivores – qui n'arrêtent pas de bouger dans les branchages. Insectivores, mais végétarien en hiver.

Paridae	Mésanges.	Attention à ne pas les confondre avec des « insectivores furtifs ».
Panuridae	Panure à moustache.	Longue queue et plumage caractéristique.
Aegithalidae	Mésange à longue queue.	Longue queue et plumage caractéristique.
Remizidae	Rémiz penduline.	Plumage immanquable.

### 1.19. Les insectivores furtifs (« Fauvettes »)

Petits insectivores souvent difficiles à voir et à identifier, généralement plus fins ou moins contrastés que les mésanges. Assez strictement insectivores, leur bec est long et fin.

Regulidae	Roitelets.	Corps tout rond, queue courte, barre alaire épaisse. Constamment en mouvement dans les branches.
Sylviidae	Fauvettes.	Bec assez épais. Pattern de tête gén. commun : front, calotte, nuque et parotiques de teinte uniforme (jamais de sourcils) contrastant avec un menton et une gorge plus clairs, souvent séparés par une moustache blanche. Menton et gorge plus clairs. Cercle oculaire, et de couleur variable. Gén., rectrices externes blanches.
Acrocephalidae	Rousserolles, phragmites, hypolaïs.	Long bec fin. Paraissent élancés, mais corps massif et taille relativement importante. Front fuyant, mais présence de plumes souvent ébouriffées au niveau de la calotte, d'où aspect « pointu » ou « bombé » au sommet du crâne. Pas de rectrices externes blanches.
Locustellidae	Locustelles.	Ventrus, queue large et étagée typique aux sous-caudales extrêmement longue.
Phylloscopidae	Pouillots.	Bec plus fin et tête plus ronde. Pas de rectrices externes blanches. Toujours un sourcil.
Cisticolidae	Cisticoles.	Ailes très courtes, taille réduite, plumage brun chaud toujours rayé.
Cettiidae	Bouscarle de Cetti.	Brun-roux au corps « compact ». La B. de C. a des ailes très courtes et la queue courte, mais large, parfois dressée comme chez un Troglodytidae.
Troglodytidae	Troglodytes.	Petits, très ronds, queue très courte tenue généralement relevée. Ailes et queue pointillées de clair et de foncé.

### 1.20. Les insectivores terrestres/percheurs (« Rougegorges »)

Passereaux plutôt petits, au bec long et assez fin, qui passent beaucoup de temps soit perchés sur une branche, un fil, un toit, soit au sol. Ils peuvent rester longtemps sans bouger, bien en vue. Ils se nourrissent le plus souvent au sol ou bien attrapent des insectes en vol. On les voit rarement chercher de la nourriture dans les feuillages comme ceux du groupe précédent.

Cinclidae	Cincles.	Massifs, queue très courte et habitat aquatique.
Motacillidae	Pipits, bergeronnettes.	Corps fin, bec pointu, longues ailes, longue queue et longues pattes. Allure svelte. Rémiges tertiaires particulièrement longues qui recouvrent les primaires, contrairement aux Muscicapidae.
Prunellidae	Accenteurs.	Différent des moineaux par leur bec d'insectivore. Allure robuste. Gris et brun dominant et parties supérieures toujours striées. Ailes et queue sont de longueur moyenne, le bec est long et pointu. Queue gén. échancrée.
Muscicapidae	Gobemouches, rossignols, rougegorges, rougequeues, tariers, traquets...	Gén. posés sur une branche ou un fil, à l'affût des insectes qui seront capturés en vol. Se nourrissent aussi au sol en sautillant de manière saccadée. Certains genres sont composés d'oiseaux rondelets et ventrus alors que d'autres peuvent être longs, fins et élégants. Primaires toujours visibles, contrairement aux Motacillidae.

### 1.21. Les granivores (« Moineaux »)

Passereaux moyens ou petits avec un bec conique.

Passeridae	Moineaux, niverolles.	Longs et massifs, aspect lourd, queue plutôt rectangulaire, bec massif.
Fringillidae	Pinsons et alliés.	Queue assez courte et échancrée, bec très conique, souvent épais et bien triangulaire, pointu (sauf becs-croisés).
Emberizidae	Bruants.	Longue queue échancrée, ailes assez courtes, bec plutôt petit paraissant légèrement tronqué.
Calcariidae	Bruants (B. lapon, B. des neiges).	= Emberizidae, mais très longues ailes (projections primaires).

## 2. B I B L I O G R A P H I E

SCHOLLAERT (Valéry), *Méthode formation ornitho*. Éditions Weyrich, 2008.

HAYMAN (Peter) & HUME (Rob), *Encyclopédie des oiseaux de France et d'Europe*. Éditions Flammarion, 2003.

BEAMAN (Mark) & MADGE (Steve), *Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique Occidental*. Éditions Nathan, 1998.

SVENSSON (Lars), MULLARNEY (Killian) & ZETTERSTRÖM (Dan), *Le Guide Ornitho*. Éditions Delachaux et Niestlé, 2015.



# SOCIETE ROYALE CERCLES DES NATURALISTES DE BELGIQUE

## Section *ATTIRE D'AILES* (CREEE LE 28/03/2010)

**Président** Francis MAUHIN  
BE 4670 BLEGNY  
Tél...+32498152610  
Mél ..[francis.mauhin@gmail.com](mailto:francis.mauhin@gmail.com)

**Vice-président** Alain BOENTEN  
BE 4100 BONCELLES  
Tél...+32475763332  
Mél...[alain.boenten@gmail.com](mailto:alain.boenten@gmail.com)



### Comment s'abonner ?

Pour recevoir le bulletin « *L'ÉRABLE* » (4 numéros par an) et, de ce fait, être membre de la **SOCIETE ROYALE CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE**,  
il vous suffit de verser la somme de :

- 8,00 € : étudiant
- 15,00 € : adulte
- 25,00 € : famille (indiquer les prénoms)
- 280,00 € : membre à vie

au compte BE38 **0013 0048 6272**  
de la **SOCIETE ROYALE CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE**  
rue des Écoles 21 à BE 5670 **VIERVES SUR VIROIN**  
Téléphone 060 39 98 78  
Télécopie 060 39 94 36  
Mél [CNBCMV@skynet.be](mailto:CNBCMV@skynet.be)  
Site Web <http://www.cercles-naturalistes.be>

Veillez à préciser la **section** à laquelle vous désirez **adhérer**.

**Les dons de 40,00 euros minimums (en plus de la cotisation) peuvent bénéficier d'une exonération fiscale.**

