

SONCHUS

1	Involucre à poils glanduleux rares ou nuls. Plantes annuelles ou bisannuelles à racines grêles, gén. ramifiées.	2
	Involucre à nombreux poils glanduleux. Plantes vivaces rhizomateuses, gén. non ramifiées, du moins dans sa partie inférieure.	3
2	Feuilles plus ou moins coriaces, à dents piquantes. Akènes lisses. <i>20-60(-100) cm. — Juin-nov. — Cultures, jardins, terrains vagues, friches, endroits rudéralisés, coupes forestières. — C.</i>	<i>S. asper</i> (Laiteron rude)
	Feuilles molles, à dents non ou faiblement piquantes. Akènes ridés transversalement. <i>20-80(-150) cm. — Juin-nov. — Cultures, jardins, terrains vagues, endroits rudéralisés. — C, sauf Ard. : AR.</i>	<i>S. oleraceus</i> (Laiteron maraîcher)
3	Involucre à poils glanduleux jaunes. Plantes communes des cultures et des sites rudéralisés. <i>40-120 cm. — Juill.-nov. — Moissons, friches, cultures, endroits rudéralisés, digues, dunes. — C-AC, sauf Boul. et Camp. : AR.</i>	<i>S. arvensis</i> (Laiteron des champs)
	Involucre à poils glanduleux noirâtres. Plantes rares des marais tourbeux et des roselières en domaine atlantique. <i>90-300 cm. — Juill.-sept. — Marais tourbeux, roselières. — Tert. par. : R ; Mar. sept. (Pays-Bas), Fl. (bords de l'Escaut en aval de Rupelmonde), Camp. occ., Brab., Champ. : R-RR ; Pic. or., Mosan, Ard. occ., Lorr. (NW) : RR.</i>	<i>S. palustris</i> (Laiteron des marais)
<i>Francis MAUHIN — CNB — 2021</i>		