

## TRAGOPOGON

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 1                           | <p>Fleurs lilas, pourpres ou violacées, Pédoncule très renflé à maturité (sous le capitule).<br/> <i>40-120 cm. — Juin-juill. — Hémicrypt. — Dignes, bord des chemins, terrains vagues. — Mar. (surtout sept.) : R-RR, naturalisé ; ailleurs : parfois adventice ou subsponané. Cultivé dans les jardins (surtout jadis) pour sa racine alimentaire. — Probablement originaire de la région méditerranéenne centr. et or. Naturalisé dans diverses régions tempérées.</i></p>   | <p><i>T. porrifolius</i><br/> (Salsifis blanc)</p>  |
|                             | Fleurs jaunes.  | 2   |
| 2                           | <p>Styles violet foncé. Pédoncule très renflé à maturité, de plus de 1 cm de large. Akènes de plus de 2,5 cm de long.<br/> <i>20-60 cm. — Mai-août. — Hémicrypt. — Dunes, digues, talus, terrils, bord des chemins et des cultures, surtout sur des sols calcarifères. — Mar. : AC-AR, en extension depuis la fin des années 90, probablement introduit ; Champ., Tert. par. : RR ; ailleurs : adventice ou parfois naturalisé localement (notamment Fl. aux env. de Gand et terrils du Brab. occ. et du Pic. sept.).</i></p> | <p><i>T. dubius</i><br/> (Salsifis pâle)</p>        |
|                             | <p>Styles jaunes. Pédoncule peu renflé à maturité. Akènes de moins de 2,5 cm de long.<br/> <i>20-70 cm. — Mai-juill. — Hémicrypt. — Prairies, friches, coupes forestières, bord des chemins. — Mellifère. — Trois sous-espèces dans le territoire de la Flore, entre lesquelles existent peut-être des intermédiaires.</i></p>  | <p><i>T. pratensis</i><br/> (Salsifis des prés)</p> |
| Francis MAUHIN — CNB — 2021 |   |   |