




CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE® asbl



Les **Accipitriformes**

par **Francis MAUHIN**

Effectifs de rapaces dans le Paléarctique occidental et en Belgique

Famille des Accipitridés (par ordre alphabétique)

1	2	3	4			5
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i> (Accipitridés)	135 000 à 160 000	476 – 820 (2002)			♂ 93 – 105 ♀ 108 – 127 ♂ 49 – 56 ♀ 58 – 64
			Stable			
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i> (Accipitridés)	120 000 à 165 000	464 – 702 (2002)			113 – 135 52 – 59
			Stable			
			104	05		
			308	09	210	
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i> (Accipitridés)	35 000 à 50 000	6 – 12 (2002)			96 – 116 39 – 50
			Stable			
				04		
			107	208-09	310	
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i> (Accipitridés)	70 000 à 85 000	169 – 208 (2003)			115 – 140 43 – 55
			En augmentation			
			103	04	205	
			208	09	310	
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i> (Accipitridés)	30 000 à 40 000	Visiteur d'hiver			97 – 118 42 – 55
			Stable			
				03	205	
			106	10		
Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i> (Accipitridés)	110 000 à 120 000	Visiteur d'hiver			123 – 140 49 – 59
			Stable			
					202	
			310	11	12	
Buse variable	<i>Buteo buteo</i> (Accipitridés)	900 000 à 1 000 000	5 342 – 7 857 (2002)			110 – 132 46 – 58
			Stable			
			202	03	305	
			308	209-10	311	
Épervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i> (Accipitridés)	350 000 à 400 000	3 030 – 4 628 (2002)			♂ 58 – 65 ♀ 67 – 80 ♂ 29 – 34 ♀ 35 – 41
			En augmentation			
				03		
			308	09-10		
Milan noir	<i>Milvus migrans</i> (Accipitridés)	83 000 à 145 000	18 – 28 (2002)			130 – 155 48 – 58
			En augmentation			
			103	04		
			307		309	
Milan royal	<i>Milvus milvus</i> (Accipitridés)	32 000 à 33 000	51 – 81 (2002)			140 – 165 61 – 72
			En régression			
			202	03	206	
			208	09	310	

Famille des Pandionidés (un seul représentant)

1	2	3	4			5
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i> (Pandionidés)	7 600 à 9 500	En période migratoire			152 – 167 52 – 60
			ES-AN			
			302	04-205	306	
			307	08-09	310	

Famille des Falconidés (par ordre alphabétique)

1	2	3	4			5
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i> (Falconidés)	325 000 à 445 000	3 763 – 6 019 (2002)			68 – 78 31 – 37
			Stable			
			202	03	204	
			307	209- 210	11	
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i> (Falconidés)	25 000 à 55 000	Visiteur d'hiver			55 – 69 26 – 33
				03	105	
			308	10- 0211		
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i> (Falconidés)	100 000 à 150 000	593 – 991 (2002)			70 – 84 29 – 35
			En augmentation			
			303	304		
			208	209- 210	310	
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i> (Falconidés)	10 000 à 11 000	24 – 26 (2002)			♂ 89 – 100 ♀ 104 – 113 38 – 51
			En augmentation			
				03		
			08	09-11		

Sources : GÉNSBØL (Benny), *Guide des rapaces diurnes. Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient*. Éditions Delachaux et Niestlé, 2005.

Légende

Colonne 1Nom français.

Colonne 2Nom latin.

Nom de la famille.

Colonne 3Estimation des effectifs dans le Paléarctique occidental.

Colonne 4Estimation du nombre de couples effectifs en Belgique (année de référence).

Évolution.

Date de migration printanière (début – pic – fin).

Date de migration automnale (début – pic – fin).

Colonne 5Envergure en cm.

Longueur en cm.

Clé de détermination

Avertissement

La présente clé demande une connaissance approfondie de la **Buse variable**. De même, sur le terrain, la Buse variable sera l'oiseau de référence.

Rappelons quelques critères principaux : oiseau compact de taille moyenne, aux larges ailes, à la queue relativement courte (< à la largeur des ailes à la base), et à la tête ne dépassant que légèrement du bord d'attaque des ailes.

Chez l'oiseau typique, la face inférieure du corps présente 3 zones : une poitrine foncée, un collier clair et un ventre qui peut être barré ou brun foncé presque uni. Dessins et coloration variables dessous, mais tous les taxons ont une zone claire et 2 taches foncées aux poignets.

Plane avec les ailes légèrement relevées et vers l'avant.

La Buse variable peut être facilement confondue avec la Bondrée apivore (visiteur d'été) et la Buse pattue (visiteur d'hiver).

1	Face supérieure sombre, face inférieure contrastée blanc/brun ou gris foncé. Ailes en forme de « M » étiré, très longues et relativement étroites, pointues, arquées. Queue courte, la moitié de l'aile à la base. Attention à la confusion avec les grands Goélands.	Famille des Pandionidés Balbuzard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i>)
	Taille moyenne à grande, voire très grande. Ailes courtes ou longues, larges. Oiseaux jamais vifs, plutôt majestueux.	Famille des Accipitridés 2
	Taille petite à moyennement petite. Oiseaux vifs.	Famille des Accipitridés ou des Falconidés 4
2	Grands, massifs, plumage sombre, ailes longues et larges, main développée, rémiges primaires nettement échancrées, bords des ailes parallèles.	Genre <i>Aquila</i> (Aigles) et <i>Haliaeetus</i> (Pygargues)
	Idem, mais tête moins proéminente, queue courte, ailes plus larges, digitation plus prononcée. Vol à voile continu.	Vautours
	Type « buse », oiseau de référence à connaître absolument. Taille moyenne à moyennement grande. Ailes larges, longues ou très longues. Digitation des primaires moins forte.	Buses, Bondrées, Busards, Milans, mais aussi les « petits Aigles », les Circaètes 3
3	Voir avertissement.	Buses et Bondrées
	Taille moyenne. Longues ailes étroites. Oiseaux chassant en volant bas. En vol : battements alternant avec des planés ailes relevées.	Busards
	Oiseau fin, longue queue nettement à faiblement échancrée. Vol : coups d'ailes lents et souples.	Milans
	Grand oiseau d'allure élégante, bien proportionné. Face inférieure claire contrastant avec la tête et la gorge gén. foncées.	Circaète Jean-le-Blanc
	Taille moyenne.	Aigles bottés et de Bonelli

4	Ailes jamais pointues, larges, arrondies et courtes. Queue étroite à bords parallèles, plus longue que la largeur de l'aile à la base. Vol : quelques battements rapides suivis d'un bref plané.	Famille des Accipitridés Genre <i>Accipiter</i> (Éperviers + Autours)
	Ailes primaires pointues. Queue étroite à bords parallèles, égale ou plus longue que la largeur de l'aile à la base. Vol : vol battu rapide soutenu ou de longs planés.	Famille des Falconidés

Guides indispensables

SVENSSON (Lars), MULLARNEY (Killian), ZETTERSTRÖM (Dan) et GRANT (Peter J.), *Le guide ornitho*. Éditions Delachaux et Niestlé, 2000.

GÉNSBØL (Benny), *Guide des rapaces diurnes. Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient*. Éditions Delachaux et Niestlé, 2005.¹

¹ Édition originale : *Rovfuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten*. Nordisk Forlag A/S, 2004.